


LIHTNE STRATEEGIA



KOLMEOSALINE LESEKASVATUSRAAM

Kontrollida iga 7 päeva järel

1. Haudmeraamide kõrvale või vahele antakse tühi raam
2. Esimesel vaatlusel lõigatakse välja 1. osa
3. Teisel vaatlusel lõigatakse välja 2. osa
4. Kolmandal vaatlusel lõigatakse välja 3. osa. Selles on kaanetatud haue
5. Järgneval vaatlusel lõigatakse välja osa, milles on kaanetatud haue



KRÄMERI PLAAT, MILLES ON 200-250 ML 85% SIPELGHAPET

- Plaat asetada kahele abiliistule 2 cm õhuvahetega kõrgede ülemistest liistudest
- Jätta ca 8 cm kõrgune aurumisruum
- Pesaruum katta selliselt, et ventilatsioon toimiks vaid taru lennuava kaudu.
- Plaati ümbritsevasse kilesse teha pilud või augud sipelghappe aurumiseks
- Tõrjeaeg 10-12 päeva.



OBLIKHAPPE TILGUTAMINE

- Oblikhappe on väga tõhus, kuid ei toimi kaanetatud haudmes
- Lestatõrje (hilissügisel) haudmevabal perioodil.
- Doseerimine: 4-5 ml talvituvate mesilastega kaetud kärjetänava kohta

LESTADE LANGEMINE JUUNIS

- Alla 1 > Vastuvõetav tase
- 1-8 > Kõrgendatud tähelepanu
- Üle 8 > Hädavajalik viivitamatu lisatõrje

LESTADE LANGEMINE HILISSÜGISESE TÕRJE AJAL

(monitoring 72h):

- Alla 50 > vastuvõetav tase. Kevadine tõrje ei ole vajalik.
- 50-100 > kevadine tõrje vajalik.
- Üle 100 > tugev tabandumus, kõrgendatud tähelepanu järgmisel hooajal

