

## **Kokkuvõtte teemal: Emade vahetus. Suira eraldamine kärgedest.**

**Aeg ja koht: Järvamaa Mesinike Seltsi mesinike õppe- ja teabepäev, Kilplala saalis Müüsleri külas, Kareda vallas, Järvamaal, 20.04.2013.a.**

**Lektor: Kalle Vihtre, lektorileping PR-9-1.4-53**

Mai alguseks peaks olema selge kevadesse tulnud perede arv, olukord ja sööda varu. Viimane aeg tõsta mesilaspered puhastesse tarudesse. Sööda puuduse all kannatavatele peredele võib anda vedelat lisa sööta, suhkrulahu 1:1, sööta 1 liiter korraga paari päeva tagant.

Nõrkade, tervete perede toetuseks võib lisada neile kooruvat hauet tugevamatest peredest, pesad soojustada.

Mai kuus on juba piisavalt õietolmu ja nektari korjet, et tugevamad pered saaksid areneda, tagada mesilasemadele piisav munemisruum.

Mai kuus algab intensiivne kärjepõhjade üles ehitamine. Üks pere peaks ehitama üles vähemalt kaheksa kuni kümme eesti raami mõõtu kärjepõhja.

Mai lõpus, juuni algul algab sülemlemisperiod. Tuleb hakata kasutama sülemlemisvastaseid mesindamisvõtteid (emalahutusvõre, kaanetatud haudme eemaldamine, uute noorte perede tegemine, mesilasemade vahetus, jne).

Jaanipäevast algab meil peameekorje ja peab kindlustama piisava kärjevaru nektari paigutamiseks, võib piirata mesilasema munemist, lisada meemagasinid ja/või korpused.

Kevadine küps mesi vurritada, võib kristalliseeruda kärjes.

Juuli lõpp augusti algus on meevõtmine, vajadus mesilasemade vahetus, saab teha uusi mesilasperesid. Algab talveks ette valmistumine.

Pärast mee võtmist alustada talvepesade ettevalmistamist ja soodustada mesilasemade munemist. Alustada varroatoosi raviga.

Pesade koondamine.

Talveks lisa söötmine.

### **Suira eraldamine kärgedest**

Suira kärjed kuivatada.

Suirased kärjeosad lõigata või murda raamidest välja ning purustada.

Purustatud kärjed sõeluda ja/või tuulutada.

Säilitada jahedas.

### **Mesilasemade vahetus**

Edukaks mesilasemade vahetuseks on teatavad tingimused.

Peres on noored mesilased ja kaanetatud haue.

On korje.

Mesilasperet söödetakse.

Mesilased ja ema on samast rassist.

Ema koorub tarus või on äsja koorunud.

Uut mesilasema ei võeta vastu kui peres on juba ema, on sülemi- või aseemakupud.

Peres on palju vanu mesilasi, korjepuudus, halb ilmastik.

Mesilasema olemasolu peres saab kindlaks teha kontrollkärjega.

Mesilasema andmise moodused:

saatepuuriga avamiseks, emakattevõrguga või otse kärjele, viimane nõuab teatud kogemusi.